

CICLOCONIO o OCCHIO DI PAVONE

Schede Fitosanitarie



Occhio di Pavone – Cicloconi o- Vaiuolo - *Cycloconium oleaginum* Cast. è un fungo presente in tutto l'areale di coltivazione dell'olivo. Si manifesta sul finire dell'autunno o al principio della primavera sotto forma di macchioline brune o nerastre con anelli concentrici e circondate da un alone giallastro, presenti su tutti gli organi verdi, principalmente sulla pagina superiore delle foglie. L'attacco provoca la caduta prematura delle foglie, specialmente delle più vecchie.



La filloptosi varia a seconda della gravità dell'attacco generalmente più intenso in primavera con elevate umidità e temperature intorno ai 12°. Possibili attacchi autunnali, in quanto i conidi germinano anche a basse temperature.

Possono essere colpite anche le drupe con un danno generalmente scarso che provoca una diminuzione della quantità di olio estratto ma con scarsa influenza sulla qualità.



Il fungo rimane vitale nei tessuti per tutto l'anno con periodi di quiescenza nelle stagioni invernali ed estive (sotto i 4° e sopra i 25°). Il suo ciclo è molto legato all'acqua, si diffonde infatti come conidi germinati dalla lesioni presenti sulla pianta trasportati nelle gocce d'acqua e con periodi umidi o piovosi, riesce a penetrare nei tessuti verdi della pianta.

I danni maggiori si riscontrano negli uliveti con chiome fitte, poco ventilati, in ambienti umidi o eccessivamente concimati con azoto.

La lotta si può effettuare con sali di rame in autunno o primavera, generalmente nel periodo di post-potatura anche per cicatrizzare i tagli operati sulla pianta.

Consigliabile comunque, nelle località soggette, l'impianto di Cv meno sensibili.

